

«САЛИВЕТ»

При локомоторных проблемах

«САЛИВЕТ» — это смесь натуральных салицилатов, изолированных из лабазника болотного и коры ивы. Натуральные салицилаты обладают противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим и успокаивающим действиями, тормозят агрегацию тромбоцитов, препятствуют тромбообразованию. Разжижая кровь, они оказывают профилактическое действие для предотвращения нарушений кровеносной системы. Одним из компонентов смеси растительных экстрактов препарата является фенологликозид салицин, который под действием ферментов превращается в салициловую кислоту, подавляющую синтез простагландинов, что приводит к снижению воспалительных процессов. Кроме того, салициловая кислота тормозит функцию зон головного мозга, связанных с передачей болевых ощущений, оказывая тем самым анальгезирующее действие. Гликозид салицин действуя на центры терморегуляции, обуславливает жаропонижающее свойство препарата, проявляющееся расширением подкожных сосудов и повышением скорости теплоотдачи. Терапевтический эффект салицина дополняют другие компоненты растительных экстрактов: флавоноиды и дубильные вещества, обладающие противовоспалительным и обезболивающим действием. Препарат как слабая горечь мягко стимулирует пищеварение и повышает поедаемость корма. Препарат не накапливается и полностью метаболизируется в организме птицы. Натуральные салицилаты данного препарата – это самое лучшее решение проблем, связанных с выращиванием молодняка, а также на финальном этапе откорма.



СОСТАВ (в 1 л): 500 г экстракта лабазника болотного и 500 г экстракта ивы белой.

ПОКАЗАНИЯ: препарат применяют всем видам птиц с лечебно-профилактической целью при локомоторных проблемах, вызванных воспалениями суставов, ломкости кровеносных сосудов, нарушениях сердечно-сосудистой системы, вызванных слишком быстрым темпом роста птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ: «САЛИВЕТ» задают из расчета 400 мл препарата на 1000 л питьевой воды в течение 12 ч методом прямого выпаивания на протяжении 3-7 дней. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении признаков аллергических реакций применение прекращают, внутрь дают антигистаминные средства. Убой птицы на мясо разрешается без ограничений.

УПАКОВКА: препарат расфасовывают в полимерную тару по 500,0; 1000,0; 5000,0 и 25000,0 см³ и хранят с предосторожностью (список Б) при температуре от 0 °С до плюс 30 °С в сухом, защищенном от света месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «БиоПоинтВосток».