

# «ДЕФУНГАЛ»

Приостанавливает рост патогенных грибов

«ДЕФУНГАЛ» — препарат против грибов, проявляющий сильное фунгицидное действие против грибов *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus* и *Candida albicans*. Отличная эффективность препарата следует из одновременного применения йода, смеси натуральных эфирных масел, экстракта чистотела большого и витамина А. Профилактическое применение данного препарата сводит к минимуму риск развития и появления микоза и заболеваний верхних дыхательных путей. Масло чайного дерева и сосны обыкновенной оказывают бактерицидное, противогрибковое, противовирусное и иммуностимулирующее действия. Йодид калия и масло чайного дерева обладают отхаркивающим действием, что способствует очистке дыхательных путей от слизи. Чистотел большой обладает бактериостатическим и фунгистатическим действиями. Витамин А способствует восстановлению эпителия респираторного и желудочно-кишечного тракта.



**СОСТАВ (в 1 мл):** 1 500 МЕ витамина А; 0,03 г калия йодистого; 0,06 г масла чайного дерева и 0,06 г эфирного масла сосны обыкновенной; 0,6 г экстракта чистотела большого.

**ПОКАЗАНИЯ:** препарат предназначен для всех видов домашней птицы:

- с профилактической целью в течение всего периода выращивания или в ситуации повышенного риска (например, применение подстилки худшего качества, подозрение на заражение птенцов спорами грибов в инкубатории);
- с восстановительной и вспомогательной целью для желудочно-кишечного тракта во время и после лечения антибиотиками, а также в лечебных целях в случае появления микоза органов дыхания и системы органов пищеварения.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ДОЗИРОВКА – с питьевой водой:

Профилактика: 100-200 мл/1000 л воды выпаивать 8-12 часов/день в течение 3-5 дней.

Лечение: 200-300 мл/1000 л воды выпаивать 8-12 часов/день в течение 5 дней.

«ДЕФУНГАЛ» без ограничения можно совмещать с кормовыми добавками, используемыми в комбикормах, включая терапевтические антибиотики. Побочных действий при применении препарата не выявлено. Противопоказания к применению отсутствуют. Убой птицы на мясо разрешается без ограничений.

**УПАКОВКА:** препарат расфасовывают по 50,0; 1000,0 и 5000,0 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы или в полимерную тару с завинчивающимися крышками и хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 г.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «БиоПоинтВосток».